



今やる！サツマイモ基腐病対策のポイント



【排水対策、苗消毒、抜き取り、予防防除】

県農政部農産園芸課

【ほ場】 排水対策を行い、ほ場に水が溜まらないようにしましょう！

基腐病菌は水を介して移動するため、水が溜まりやすいほ場で感染株が増加します。感染してからでは被害を抑えることが難しくなるため、以下の作業を行い、ほ場に水が溜まらないようにしましょう。




額縁明きよと排水路を接続



排水路の土砂を除去

【育苗】 植付前には、必ず苗をベンレート水和剤等で消毒しましょう！



- 地際から5cm以上離れた位置で採苗しましょう。
- 採苗で使用するハサミはこまめに消毒しましょう。
- 苗全体を薬液に30分間浸けるようにしましょう。
- 薬液は使用日ごとに毎回調製しましょう。

【ほ場】 異常株の早期発見・抜き取り・定期的な予防防除を徹底しましょう！

- 定期的にはほ場を見回り、葉の変色やしおれ症状等の異常株を早期に発見し、速やかにほ場外に持ち出しましょう。
- 異常株を持ち出すときは、株や周辺の土がほ場内に落ちないように注意し、異常株を除去した後は補植しないようにしましょう。
- 下記の散布例を参考に、予防防除を徹底しましょう。



区分	植付前		植付後		
	畝立て前	苗消毒	1回目	2回目	3回目
1例	フリントフロアブル25 (全面散布土壌混和)	ベンレート水和剤 (30分間苗浸漬)	植付から21日後 フロンサイドSC (300L/10a)	1回目から14日後 フロンサイドSC (300L/10a)	2回目から30日後 トリフミン水和剤 (300L/10a)
2例	フロンサイドSC (全面散布土壌混和)	ベンレート水和剤 (30分間苗浸漬)	植付から21日後 フロンサイドSC (300L/10a)	1回目から14日後 フロンサイドSC (300L/10a)	2回目から30日後 アミスター20フロアブル (300L/10a)
3例	—	ベンレート水和剤 (30分間苗浸漬)	植付から35日後 アミスター20フロアブル (100L/10a)	1回目から14日後 銅剤 (200L/10a)	2回目から14日後 アミスター20フロアブル (300L/10a)



ご不明な点がございましたら、お近くのサツマイモ基腐病対策プロジェクトチーム（事務局：地域振興局・支庁農政普及課）にご連絡ください。
※本資料は生研支援センター「イノベーション創出強化研究進事業」(01020C)、「戦略的スマート農業技術等の開発・改良」(SA2-102N)の成果を活用しました。